



DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ  
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR  
DÎMBOVIȚA

SERVICIUL CONTROL OFICIAL SANATATEA SI BUNASTAREA  
ANIMALELOR

Nr. 10348 / 06 NOV. 2024

Catre,

**Primaria.....**

La nivel european au fost raportate focare de gripa aviara inalt patogena in 30 de tari, afectand 283 ferme de pasari domestice si 619 cazuri la pasarile salbatice;

In ultimele doua saptamani au fost inregistrate focare in 25 de exploataii comerciale din 7 state membre ale Uniunii Europene, ceea ce a dus la sacrificarea a peste 1,5 milioane de pasari;

In Romania, in aceasta perioada a fost inregistrat in judetul Tulcea un focar la o exploatare non-comerciala de pasari (20 galinacee si 27 palmipede);

In aceasta perioada are loc migratia de toamna a pasarilor salbatice, palmipelele reprezentand rezervorul natural pentru virusul HPAI, ceea ce implica un risc crescut de raspandire a virusului pe teritoriul Romaniei.

Ca urmare a celor prezentate este necesara aplicarea de masuri suplimentare de biosecuritate **in gospodariile populatiei**, pentru a reduce riscul de contact intre pasarile domestice si cele salbatice:

**1.Separarea speciilor:** In masura posibilitatilor, ratele si gastele vor fi separate de alte pasari domestice pentru a limita transmiterea virusului gripei aviare.

**2.Cresterea pasarilor in spatii inchise:** Pasarile domestice vor fi crescute in spatii special amenajate si inchise. In cazul in care acest lucru nu este posibil, hranirea si adaparea lor vor fi efectuate intr-o zona acoperita, inaccesibila pasarilor salbatice.

**3.Interdictia utilizarii apei de suprafata:** Se interzice adaparea pasarilor domestice cu apa provenita din rezervoarele de apa de suprafata accesibile pasarilor salbatice.

**4.Limitarea accesului uman in zonele de crestere:** Accesul in zonele de exploatare a pasarilor domestice va fi restrictionat la o singura persoana responsabila de ingrijirea animalelor, pentru a reduce riscul de introducere a virusului.

**5.Prevenirea contactului cu alte animale:** Se vor lua masuri pentru a preveni contactul pasarilor domestice cu alte specii de mamifere, inclusiv rozatoare si animale de companie.

**6.Dezinfectarea incaltamintei:** Pentru a evita introducerea sau diseminarea virusului, se va utiliza incaltaminte dedicata in spatiile de crestere a pasarilor domestice sau se va amenaja un spatiu pentru dezinfectarea incaltamintei.

**7.Prevenirea contactului cu pasarile salbatice :** Este esential sa se previna contactul direct si indirect intre pasarile salbatice si cele domestice. Se va limita



DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ  
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR  
DÎMBOVIȚA

accesul pasarilor domestice si al celor salbatice captive la sursele de apa naturale sau artificiale, cum ar fi lacuri, balti si rauri.

Aceste informatii vor fi comunicate proprietarilor de pasari prin intermediul relelelor de socializare, media, etc.

In atasament va transmitem un pliant de informare ce trebuie afisat in spatiile publice.

Di  
Dr.To

cutiv,  
i Marius



	<b>Nume, Prenume</b>	<b>Funcție</b>	<b>Data</b>	<b>Semnatura</b>
Avizat	Dr. Bucur Marius	Director Executiv Adjunct	05.11.2024	
Avizat	Dr. Cobianu Liviu	Sef SCOSBA	05.11.2024	
Elaborat	Dr. Sillo Razvan	SCOSBA	05.11..2024	



## AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR



### Gripă aviară (Influență aviară)

- boală virală extrem de contagioasă, care afectează în principal păsările, dar poate infecta și specii de mamifere-

**Gripa aviară poate ucide efective întregi de păsări, cauzând pierderi devastatoare.**

#### Factori care pot contribui la răspândirea virusului:

- păsările sălbatice și rutele de migrație;
- aglomerări de păsări sau piețele vii;
- comerțul necontrolat cu păsări vii;

#### Simptome clinice:

- decubit prelungit, stare letargică;
- inapetență, încetarea ouatului;
- respirație greoaie, tuse, febră;
- aripi zburlite, torticolis, paralizie;
- secreții din cioc și nări;
- creasta și bărbilele umflate, de culoare roșu închis;



#### Crescătorii de păsări trebuie să respecte următoarele reguli:

- să anunțe medicul veterinar atunci când apar simptome de îmbolnăvire sau moarte la păsări sau animale;
- să își țină păsările închise în adăposturi pentru a reduce contactul cu alte păsări sălbatice;
- să limiteze accesul păsărilor domestice la luciuri de apă (bălți, lacuri, etc.);
- să acorde tot sprijinul medicilor veterinari și autorităților sanitar-veterinare și să respecte legislația în vigoare privind circulația și transportul păsărilor;
- să respecte normele de biosecuritate;